

Benin Ağız Lezyonları Nedir?

Çalışma Kağıdı

Benin ağız lezyonları, ağız dokularında oluşan, genellikle iyi huylu ve malign transformasyon (kötü huylu değişime uğrama) riski az olan lezyonlardır. Bu lezyonlar, enfeksiyonlar, travmalar, alerjik reaksiyonlar veya gelişimsel anomaliler sonucu ortaya çıkabilir.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi benin ağız lezyonlarına örnek VERİLEMEZ?

- A) Aftöz Ülser
- B) Fibrom
- C) Lökoplaki
- D) Squamöz Hücreli Karsinom

2. Kronik travma sonucu oluşan, iyi sınırlı, sert lezyonun adı nedir?

- A) Liken Planus
- B) Fibrom
- C) Granülom
- D) Papillom

3. Ağız mukozasında soyulamayan beyaz plaklar ne olarak adlandırılır ve en önemli özelliği nedir?

- A) Eritroplaki, ağrılıdır
- B) Lökoplaki, malign transformasyon riski taşır
- C) Oral kandidiyazis, beyazdır
- D) Liken planus, ağızda çizgilenmeler yapar

4. En sık görülen benin ağız lezyonlarından biri nedir ve belirtileri nelerdir?

5. Fibrom (epulis fissuratum) nasıl bir benin lezyondur ve neden oluşur?

6. Lökoplaki benin midir ve dikkat edilmesi gereken yönleri nelerdir?

7. Tanımla: Benin Ağız Lezyonu Nedir?

8. Tanımla: Aftöz Ülser Belirtileri

9. Tanımla: Fibrom Oluşum Nedeni

Cevap Anahtarı

1. D) Squamöz Hücreli Karsinom — Squamöz hücreli karsinom, malign (kötü huylu) bir ağız kanseri türüdür. Diğerleri ise genellikle benin lezyonlardır.
2. B) Fibrom — Fibrom, genellikle kronik tahriş veya travmaya yanıt olarak gelişen, iyi sınırlı, sert, iyi huylu bir tümördür.
3. B) Lökoplaki, malign transformasyon riski taşır — Lökoplaki, ağız mukozasında soyulamayan beyaz plaklardır ve yaklaşık %5-10'unda displazi veya karsinom gelişme riski bulunur.
4. En sık görülenlerden biri 'aftöz ülser'dir. Genellikle yuvarlak veya oval, ortası sarımsı beyaz, kenarları kırmızı iltihaplı bir haledede çevrili ağrılı lezyonlardır. Tek veya birden fazla sayıda görülebilirler.
5. Fibrom, genellikle kronik travmaya bağlı olarak oluşan, iyi sınırlı, sert, mukozal renkte veya hafif pembe renkte bir lezyondur. Özellikle protez kenarlarının tahriş ettiği bölgelerde görülür.
6. Lökoplaki, ağız mukozasında soyulamayan beyaz plaklardır. Tamamı benin olmasa da, %5-10 oranında displazi veya karsinom içerebilir. Bu nedenle biyopsi ile değerlendirilmesi önemlidir.
7. Kanserleşme riski düşük, iyi huylu ağız lezyonları.
8. Ağrılı, sarımsı beyaz ortali, kırmızı kenarlı yuvarlak/oval lezyonlar.
9. Kronik travma (örn: protez kenarı tahrişi).

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.