

Diş Muayenehanesinde Tıbbi Acil Yönetimi Nedir?

Çalışma Kağıdı

Diş muayenehanesinde tıbbi acil yönetimi, diş hekimliği ortamında aniden ortaya çıkan hayatı tehdit edici veya ciddi sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmayı, bu durumları doğru bir şekilde değerlendirmeyi ve uygun ilk müdahaleleri yaparak hastanın stabilizasyonunu sağlamayı ifade eder.

Sorular

1. Hastanın aniden bilincini kaybedip yere yığıldığı durumda ilk yapılması gereken nedir?

- A) Hastayı ayağa kaldırmaya çalışmak
- B) Hemen acil servisi aramak
- C) Hastayı sırt üstü yatırıp bacaklarını kaldırmak
- D) Hastaya su içirmek

2. Diş hekimliği muayenehanesinde anafilaksi belirtileri gösteren bir hastaya ilk olarak ne uygulanmalıdır?

- A) Morfin enjeksiyonu
- B) Adrenalin (epinefrin) enjeksiyonu
- C) Aspirin verilmesi
- D) Bol su içirilmesi

3. Tıbbi acil durumlar için muayenehanede bulundurulması gereken ilaçlardan biri değildir?

- A) Adrenalin
- B) Antihistaminik
- C) Antibiyotik
- D) Kortikosteroid

4. Senkop (Bayılma) Durumunda Ne Yapılmalı?

5. Anafilaksi (Alerjik Reaksiyon) Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

6. Astım Atağı Sırasında Uygulanacak İlk Adımlar Nelerdir?

7. Tanımla: Diş muayenehanesinde en sık görülen tıbbi acil durumlar nelerdir?

8. Tanımla: Tıbbi acil durumlar için muayenehanede bulunması gereken temel ekipmanlar nelerdir?

9. Tanımla: Tıbbi acil durumlarda ilk müdahalenin amacı nedir?

Cevap Anahtarı

1. C) Hastayı sırt üstü yatırıp bacaklarını kaldırmak — Senkop durumunda hastanın beyin kan akımını artırmak için bacakları kaldırılmalı ve sırt üstü yatırılmalıdır.
2. B) Adrenalin (epinefrin) enjeksiyonu — Anafilaksi hayatı tehdit eden ciddi bir alerjik reaksiyondur ve acil adrenalin enjeksiyonu gerektirir.
3. C) Antibiyotik — Antibiyotikler genellikle acil durum ilaçları arasında yer almaz; acil müdahale gerektiren durumlar için adrenalin, antihistaminikler ve kortikosteroidler daha önceliklidir.
4. 1. Hastayı hemen sırt üstü yatırın ve bacaklarını kaldırın. 2. Hava yolunu açık tutun ve gerekirse oksijen verin. 3. Sıkı giysileri gevşetin. 4. Bilinç dönene kadar hastayı gözlemleyin. 5. Nedenini belirlemeye çalışın ve gerekirse tıbbi yardım isteyin.
5. 1. Hastanın solunumunu ve dolaşımını değerlendirin. 2. Acil tıbbi yardım çağırın. 3. Hastanın bilinci yerindeyse ve yutabiliyorsa, antihistaminik verin. 4. Adrenalin (epinefrin) enjeksiyonu yapın (eğitimli personel tarafından). 5. Hastayı yakından izleyin.
6. 1. Hastayı rahat bir pozisyona getirin (genellikle oturur pozisyon). 2. Hastanın kendi inhalerini kullanmasına yardımcı olun. 3. Solunumu değerlendirin. 4. Gerekirse oksijen uygulayın. 5. Durum kötüleşirse acil tıbbi yardım çağırın.
7. Senkop (bayılma), hipoglisemi, astım krizi, alerjik reaksiyonlar (anafilaksi), epilepsi nöbetleri, kardiyak arrest.
8. Oksijen tüpü ve maskesi, aspiratör, ambu (balon valf maske), temel ilaçlar (adrenalin, antihistaminik, kortikosteroid, glukagon), tansiyon aleti, stetoskop, glukometre, ilk yardım çantası.
9. Hastanın hayatını kurtarmak, durumunun kötüleşmesini önlemek ve hastayı daha ileri tıbbi tedavi için stabilize etmektir.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.