

Premolar Dişler Nedir?

Çalışma Kağıdı

Premolar dişler, kanin dişlerinin posteriorunda ve molar dişlerin anteriorunda yer alan, genellikle iki tüberküllü yapılarıyla bilinen dişlerdir. Fonksiyonel olarak hem kesme hem de öğütme hareketlerine katkı sağlarlar.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi premolar dişlerin genel bir özelliğidir?

- A) Tek köklü olma eğilimi
- B) Genellikle iki tüberküllü yapı
- C) Sadece kesme fonksiyonu görme
- D) Lingual tüberkülün her zaman baskın olması

2. Hangi premolar genellikle daha belirgin bir lingual tüberkül ve iki köke sahiptir?

- A) Alt birinci premolar
- B) Üst ikinci premolar
- C) Alt ikinci premolar
- D) Üst birinci premolar

3. Premolar dişlerin çiğneme zincirindeki yeri nedir?

- A) Başlangıç (kesme)
- B) Orta (parçalama/öğütme)
- C) Son (öğütme)
- D) Destek (tutma)

4. Üst Birinci Premoların Morfolojik Özellikleri Nelerdir?

5. Alt Birinci Premoların Morfolojik Özellikleri Nelerdir?

6. Premolar Dişlerin Fonksiyonel Önemi Nedir?

7. Tanımla: Premolar dişlerin genel konumu nedir?

8. Tanımla: Her çenede kaç adet premolar bulunur?

9. Tanımla: Üst birinci premoların en belirgin özelliği nedir?

Cevap Anahtarı

1. B) Genellikle iki tüberküllü yapı — Premolar dişler, özellikle üst çenedekiler, genellikle iki tüberküllü bir yapıya sahiptir. Alt çenede lingual tüberkül daha az gelişmiş olabilir ancak temel yapı iki tüberküllüdür.
2. D) Üst birinci premolar — Üst birinci premolar, genellikle iki köklü (bukkal ve lingual) ve belirgin iki tüberküllü (bukkal daha büyük) yapısıyla bilinir.
3. B) Orta (parçalama/öğütme) — Premolar dişler, kaninlerin kesme fonksiyonundan molar dişlerin öğütme fonksiyonuna geçişte yer alır ve hem parçalama hem de öğütme işlevlerine katkıda bulunurlar.
4. 1. Genellikle iki ana tüberkül (bukkal ve lingual) bulunur. 2. Bukkal tüberkül, lingual tüberkülden daha büyüktür. 3. Kökler genellikle iki adettir (bukkal ve lingual), ancak bazen tek köklü olabilir. 4. Okluzal yüzeyde, tüberküller arasındaki oluk sistemi belirgindir.
5. 1. Genellikle iki tüberkül bulunur, ancak lingual tüberkül çok küçük olabilir veya hiç olmayabilir. 2. Bukkal tüberkül daha baskındır. 3. Kök genellikle tek ve koniktir. 4. Okluzal yüzeyde, oluk sistemi üst premolara göre daha az belirgindir.
6. 1. Çiğneme kuvvetlerini azı dişlerine aktarmada köprü görevi görürler. 2. Yiyecekleri öğütme ve parçalama işlemine yardımcı olurlar. 3. Kanin dişlerinin kesme fonksiyonundan azı dişlerinin öğütme fonksiyonuna geçişi sağlarlar.
7. Kanin dişleri ile molar dişler arasındadır.
8. İki adet.
9. Genellikle iki köklü olması ve bukkal tüberkülün lingualden daha büyük olmasıdır.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.