

İlaç Kaynaklı Nefrotoksisite Nedir?

Çalışma Kağıdı

İlaç kaynaklı nefrotoksisite, böbreklerin ilaçlara karşı anormal bir yanıt vererek hasar görmesi ve fonksiyonlarının bozulmasıdır.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi ilaç kaynaklı nefrotoksisiteye neden olan ilaç gruplarından biridir?
A) Parasetamol
B) İnsülin
C) NSAID'ler
D) Beta blokerler
2. İlaç kaynaklı nefrotoksisitenin en sık görülen sonucu nedir?
A) Karaciğer yetmezliği
B) Akut böbrek hasarı (ABH)
C) Pankreatit
D) Pulmoner ödem
3. Böbrek fonksiyonlarının ilaç kullanımı nedeniyle bozulması durumuna ne ad verilir?
A) Hepatotoksisite
B) Nefrotoksisite
C) Kardiyotoksisite
D) Nörotoksisite
4. Hangi ilaç grupları nefrotoksisiteye neden olabilir?
5. İlaç kaynaklı nefrotoksisitenin belirtileri nelerdir?
6. Tanımla: Nefrotoksisite
7. Tanımla: NSAID'ler
8. Tanımla: Aminoglikozitler

Cevap Anahtarı

1. C) NSAID'ler — Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), böbrek kan akımını azaltarak nefrotoksisiteye neden olabilir.
2. B) Akut böbrek hasarı (ABH) — İlaç kaynaklı nefrotoksisitenin en sık görülen ve önemli sonuçlarından biri akut böbrek hasarıdır (ABH).
3. B) Nefrotoksisite — Böbrek fonksiyonlarının ilaç kullanımı nedeniyle bozulması durumu nefrotoksisite olarak adlandırılır.
4. Aminoglikozitler, NSAID'ler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB'ler), contrast maddeler ve bazı kemoterapötik ajanlar başlıca riskli ilaç gruplarıdır.
5. Belirtiler arasında idrar miktarında azalma, ödem, yorgunluk, bulantı, kusma ve böbrek fonksiyon testlerinde bozulma yer alabilir.
6. Böbreğe zararlı etkidir.
7. Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar; böbrek kan akımını azaltarak nefrotoksisiteye yol açabilir.
8. Antibiyotikler; proksimal tübüllerde birikerek hasara neden olabilir.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.