

Romatoid Artrit: Seroloji ve DMARD'lar Nedir?

Çalışma Kağıdı

RA'da seroloji, hastalığın tanısına yardımcı olan antikorları (RF, anti-CCP) belirlerken; DMARD'lar (hastalığı modifiye eden anti-romatizmal ilaçlar) hastalığın ilerlemesini yavaşlatarak eklem hasarını önlemeyi hedefler.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi RA'da kullanılan başlıca serolojik belirteçlerden biridir?

- A) C-Reaktif Protein (CRP)
- B) Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR)
- C) Anti-Sitruillinenmiş Peptid (Anti-CCP) Antikorları
- D) Ürik Asit

2. DMARD'ların birincil hedefi nedir?

- A) Ağrıyı anında kesmek
- B) İnflamasyonu baskılayarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak
- C) Eklem kıkırdağını tamamen yenilemek
- D) Kan basıncını düşürmek

3. RF pozitifliği RA için ne ifade eder?

- A) Kesin tanı koydurur
- B) RA'nın varlığını gösterir ancak spesifik değildir
- C) Sadece eklem dışı tutulumu gösterir
- D) Tedaviye yanıtı gösterir

4. Romatoid Faktör (RF) pozitifliği RA tanısında ne kadar önemlidir?

5. DMARD'ların etki mekanizması nasıldır?

6. Tanımla: Romatoid Artrit (RA) Nedir?

7. Tanımla: Serolojik Belirteçler Nelerdir?

8. Tanımla: Anti-CCP Antikorlarının Önemi Nedir?

Cevap Anahtarı

1. C) Anti-Sitruillinlenmiş Peptid (Anti-CCP) Antikorları — Anti-CCP antikorları, RA'nın tanısında yüksek özgüllüğe sahip önemli bir serolojik belirteçtir.
2. B) İnflamasyonu baskılayarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak — DMARD'lar, RA'nın altında yatan inflamatuvar süreci hedef alarak hastalığın seyrini değiştirmeyi amaçlar.
3. B) RA'nın varlığını gösterir ancak spesifik değildir — RF, RA hastalarında sık görülse de, diğer durumlarda da bulunabilir, bu nedenle tek başına tanı koydurucu değildir.
4. RF, RA hastalarının büyük çoğunluğunda bulunur ancak spesifik değildir; başka otoimmün hastalıklarda da görülebilir. Anti-CCP antikorları ile birlikte değerlendirilmesi tanısal doğruluğu artırır.
5. DMARD'lar, immün sistemin aşırı aktivitesini baskılayarak veya düzenleyerek inflamasyonu azaltır. Bu, hem semptomları hafifletir hem de eklem yapılarının korunmasına yardımcı olur.
6. Eklemleri hedef alan kronik, sistemik otoimmün bir inflamatuvar hastalıktır.
7. Romatoid Faktör (RF) ve Anti-Sitruillinlenmiş Peptid (Anti-CCP) antikorları.
8. RF'ye göre daha spesifiktir ve RA'nın erken tanısında ve prognozunda önemlidir.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.