

Staphylococcus aureus Klinik Belirtileri Nelerdir?

Çalışma Kağıdı

Staphylococcus aureus enfeksiyonları, lokalize cilt enfeksiyonlarından (örn. impetigo, folikülit) sistemik hastalıklara (örn. pnömoni, endokardit, sepsis) kadar geniş bir yelpazede klinik belirtiler gösterebilir.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi Staphylococcus aureus'un neden olduğu bir cilt enfeksiyonu değildir?

- A) Fronköl
- B) İmpetigo
- C) Selülit
- D) Tifo

2. Staphylococcus aureus kaynaklı gıda zehirlenmesinde belirtiler genellikle ne kadar sürede ortaya çıkar?

- A) 1-2 gün sonra
- B) 1-2 saat sonra
- C) 1-2 hafta sonra
- D) Belirti göstermez

3. Staphylococcus aureus'un kan dolaşımına yayılmasıyla ortaya çıkabilen en ciddi enfeksiyonlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Saman nezlesi
- B) Sepsis
- C) Soğuk algınlığı
- D) Mide üşütmesi

4. Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (PYT)

5. Gıda Zehirlenmesi

6. Sistemik Enfeksiyonlar

7. Tanımla: Staphylococcus aureus'un en sık görülen enfeksiyon tipi nedir?

8. Tanımla: Staphylococcus aureus'un neden olduğu gıda zehirlenmesinin tipik belirtileri nelerdir?

9. Tanımla: Staphylococcus aureus'un kan dolaşımına yayılması hangi ciddi enfeksiyonlara yol açabilir?

Cevap Anahtarı

1. D) Tifo — Tifo, Salmonella Typhi bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Fronkül, impetigo ve selülit ise Staphylococcus aureus'un yaygın cilt enfeksiyonlarıdır.
2. B) 1-2 saat sonra — Staphylococcus aureus toksinlerinin neden olduğu gıda zehirlenmesinde belirtiler genellikle hızlı bir şekilde, 1 ila 2 saat içinde ortaya çıkar.
3. B) Septisemi — Septisemi, kan zehirlenmesi olarak da bilinir ve Staphylococcus aureus'un kan dolaşımına yayılmasıyla ortaya çıkabilen hayatı tehdit eden bir durumdur.
4. Pyojenik enfeksiyonlar, Staphylococcus aureus'un en sık görülen belirtilerindendir. Bunlar arasında apse, fronkül, karbunkül, selülit ve impetigo bulunur. Lezyonlar genellikle ağrılı, kızamık ve iltihaplıdır, bazen irin birikimi gözlenir.
5. Staphylococcus aureus'un ürettiği toksinler nedeniyle oluşan gıda zehirlenmesi, genellikle enfekte bir kişinin dokunduğu yiyeceklerin tüketilmesiyle bulaşır. Belirtiler arasında ani başlayan bulantı, kusma, karın krampları ve ishal yer alır. Belirtiler genellikle 1-2 saat içinde ortaya çıkar.
6. Bakteri kan dolaşımına girerse, pnömoni (zatürre), endokardit (kalp kapakçığı iltihabı), osteomyelit (kemik iltihabı), septisemi (kan zehirlenmesi) ve toksik şok sendromu gibi ciddi sistemik enfeksiyonlara yol açabilir. Bu durumlarda ateş, titreme, halsizlik ve organ disfonksiyonu gibi belirtiler görülebilir.
7. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları (örn. apse, fronkül).
8. Ani başlayan bulantı, kusma, karın krampları ve ishal.
9. Pnömoni, endokardit, osteomyelit, septisemi, toksik şok sendromu.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.