

Akut İnme: Tromboliz ve Mekanik Trombektomi Nedir?

Çalışma Kağıdı

Akut inme tedavisinde tromboliz, damar tıkanıklığına neden olan pıhtıyı eritmek için intravenöz olarak verilen ilaç tedavisidir. Mekanik trombektomi ise, büyük damar tıkanıklıklarında anjiyografik yöntemlerle pıhtının mekanik olarak çıkarılması işlemidir.

Sorular

1. Akut iskemik inmede pıhtıyı eritmek için kullanılan ilaç tedavisine ne ad verilir?
A) Mekanik Trombektomi
B) Tromboliz
C) Anjiyoplasti
D) Stentleme
2. Hangi tedavi yöntemi, büyük damar tıkanıklıklarında pıhtının mekanik olarak çıkarılmasını sağlar?
A) Tromboliz
B) Aspirin Tedavisi
C) Mekanik Trombektomi
D) Kardiyak Kateterizasyon
3. Tromboliz tedavisinin genellikle uygulandığı maksimum zaman aralığı nedir?
A) 1 saat
B) 4.5 saat
C) 12 saat
D) 24 saat
4. Hangi hasta grubunda tromboliz ilk tercih tedavidir?
5. Mekanik trombektomi hangi durumlarda endikedir?
6. Tromboliz ve Mekanik Trombektomi Karşılaştırması
7. Tanımla: Tromboliz Nedir?
8. Tanımla: Mekanik Trombektomi Nedir?
9. Tanımla: Tromboliz Zaman Penceresi

Cevap Anahtarı

1. B) Tromboliz — Tromboliz, akut iskemik inmede pıhtıyı eritmek için kullanılan farmakolojik tedavidir.
2. C) Mekanik Trombektomi — Mekanik trombektomi, pıhtının anjiyografik yöntemlerle fiziksel olarak çıkarılmasıdır.
3. B) 4.5 saat — Tromboliz tedavisi, semptom başlangıcından itibaren genellikle ilk 4.5 saat içinde uygulanmalıdır.
4. İskemik inme geçiren ve semptom başlangıcından itibaren belirli bir zaman aralığında (genellikle 4.5 saat) hastaneye ulaşan, kontrendikasyon (tedaviye engel durum) bulunmayan hastalarda tromboliz ilk tercihtir.
5. Büyük damar tıkanıklığı olan (intrakraniyal internal karotid arter veya orta serebral arter M1 segmenti) ve tromboliz tedavisine ek olarak veya tromboliz kontrendikasyonu olan hastalarda mekanik trombektomi endikedir. Tedavi penceresi daha uzundur (örn. 24 saate kadar).
6. Tromboliz daha kolay uygulanabilir ve erken dönemde etkilidir ancak tüm pıhtıları eritmede her zaman başarılı olamayabilir. Mekanik trombektomi daha invazivdir ancak büyük pıhtılarda daha yüksek başarı oranına sahiptir ve tedavi penceresi daha geniştir. Genellikle birlikte de kullanılabilirler.
7. İntravenöz pıhtı eritici ilaç tedavisidir.
8. Anjiyografik yöntemlerle pıhtının mekanik olarak çıkarılmasıdır.
9. Genellikle 4.5 saat

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.