

Şok Türleri ve Tedavisi Nedir?

Çalışma Kağıdı

Şok, doku perfüzyonunun yetersizliği sonucu organ disfonksiyonuna yol açan, hayatı tehdit eden bir sendromdur. Tedavisi altta yatan nedene yönelik olup, destekleyici bakımı içerir.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi şokun genel bir belirtisi DEĞİLDİR?

- A) Taşikardi
- B) Hipotansiyon
- C) Bradikardi
- D) Soğuk, nemli ve soluk cilt

2. Vücudun yeterli oksijen taşıyamaması durumuna ne ad verilir?

- A) Hipertansiyon
- B) Şok
- C) Aritmi
- D) Anemi

3. Hangi şok türü genellikle enfeksiyonlara karşı vücudun verdiği aşırı yanıtta kaynaklanır?

- A) Hipovolemik Şok
- B) Kardiyojenik Şok
- C) Distributive Şok (Sepsis Şoku)
- D) Obstrüktif Şok

4. Hipovolemik Şokta Hemşirelik Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır?

5. Sepsis Şokunda İlk Müdahale Nedir?

6. Tanımla: Şokun Tanımı

7. Tanımla: En Sık Görülen Şok Türü

8. Tanımla: Kardiyojenik Şok Belirtisi

Cevap Anahtarı

1. C) Bradikardi — Şokun genel belirtileri arasında taşikardi (hızlı nabız) bulunur. Bradikardi (yavaş nabız) genellikle şokun tipik bir belirtisi değildir, ancak bazı özel durumlarda (örn. nörojenik şok) görülebilir.
2. B) Şok — Vücudun organlarına yeterli oksijen ve besin taşınamaması durumu şok olarak adlandırılır.
3. C) Distributive Şok (Sepsis Şoku) — Distributive şokun bir alt tipi olan sepsis şoku, enfeksiyonlara karşı vücudun verdiği inflamatuvar yanıtın kaynağıdır.
4. Hastanın vital bulguları (nabız, tansiyon, solunum hızı, oksijen saturasyonu) yakından izlenir.,İki adet geniş damar yolu açılır ve hızla kristaloid/kolloid sıvılar veya kan ürünleri transfüzyonu başlanır.,Kanama odağı varsa durdurulması için cerrahi ekiple işbirliği yapılır.,Hastanın pozisyonu (Trendelenburg veya modified Trendelenburg) ayarlanarak venöz dönüş artırılmaya çalışılır.,Oksijen desteği sağlanır ve gerekirse mekanik ventilasyon düşünülür.
5. Erken antibiyoterapi başlanması hayati önem taşır.,Kan kültürleri alınır.,Geniş spektrumlu antibiyotikler doktor isteğiyle uygulanır.,Sıvı resüsitasyonu (genellikle kristaloidler) ile hipotansiyon düzeltilmeye çalışılır.,Vazopresörler (örneğin norepinefrin) gerekebilir.
6. Doku perfüzyonunun yetersizliği sonucu organ disfonksiyonu ile seyreden, hayatı tehdit eden sendrom.
7. Hipovolemik Şok (kan veya sıvı kaybı)
8. Sırt ağrısı, göğüs ağrısı, taşikardi, hipotansiyon, solunum güçlüğü.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.