

Antikoagölasyon Tedavisi Nedir?

Çalışma Kağıdı

Antikoagölasyon tedavisi, kanın pıhtılaşma sürecini yavaşlatan veya engelleyen ilaçlarla uygulanan ve tromboembolik hastalıkların önlenmesi veya tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi antikoagölasyon tedavisinin birincil amacıdır?
A) Kan basıncını düşürmek
B) Kanın pıhtılaşmasını yavaşlatmak
C) Kalp atış hızını düzenlemek
D) Kan şekerini kontrol etmek
2. Atrial fibrilasyon hastalarında antikoagölasyon tedavisinin başlıca önlediği durum hangisidir?
A) Kalp krizi
B) Akciğer ödemi
C) İnme (felç)
D) Yüksek tansiyon
3. Antikoagölasyon tedavisinin en önemli ve dikkat edilmesi gereken yan etkisi nedir?
A) Bulantı ve kusma
B) Karaciğer hasarı
C) Aşırı kanama
D) Böbrek yetmezliği
4. Atrial Fibrilasyon Hastasında Antikoagölasyon Tedavisi
5. Derin Ven Trombozu (DVT) Tedavisinde Antikoagölasyon
6. Tanımla: Antikoagölasyonun Temel Amacı Nedir?
7. Tanımla: En Sık Kullanılan Antikoagölün İlaç Grupları Nelerdir?
8. Tanımla: Antikoagölasyon Tedavisinin Potansiyel Bir Yan Etkisi Nedir?

Cevap Anahtarı

1. B) Kanın pıhtılaşmasını yavaşlatmak — Antikoagülasyon tedavisinin temel amacı, kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltarak anormal pıhtı oluşumunu ve emboliyi önlemektir.
2. C) İnme (felç) — Atriyal fibrilasyon, kalpte oluşan pıhtıların beyne atarak inmeye neden olma riskini artırır. Antikoagülanlar bu riski azaltır.
3. C) Aşırı kanama — Antikoagülan ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellediği için, vücutta meydana gelebilecek küçük travmalar veya iç kanamalar daha ciddi hale gelebilir.
4. Atriyal fibrilasyon (AF) hastalarında, kalbin düzensiz atması nedeniyle kulakçıklarında kan göllenmesi ve pıhtı oluşma riski artar. Bu pıhtıların beyne atması sonucu inme (felç) gelişebilir. Bu riski azaltmak için hastaya oral antikoagülan (örn. Warfarin, Rivaroksaban, Apiksaban) reçete edilir. Tedavi süresi hastanın risk faktörlerine ve klinik durumuna göre belirlenir. Tedavi sırasında düzenli kanama takibi (INR gibi) yapılır.
5. Derin ven trombozu, genellikle bacaklardaki derin toplardamarlarda oluşan kan pıhtısıdır. Bu pıhtının akciğere atması sonucu pulmoner emboli (PE) gelişebilir. DVT teşhisi konulduğunda, pıhtının büyümesini durdurmak ve yeni pıhtı oluşumunu engellemek için hemen antikoagülan tedaviye başlanır. Genellikle başlangıçta düşük molekül ağırlıklı heparin (düşük doz LMWH) veya fondaparinux gibi enjekte edilebilir antikoagülanlar kullanılır, ardından oral antikoagülanlara geçilir. Tedavi süresi genellikle 3-6 aydır.
6. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek tromboembolik olayları önlemek.
7. Oral antikoagülanlar (Warfarin, DOAK'lar) ve enjekte edilebilir antikoagülanlar (Heparin, LMWH).
8. Kanama riski.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.